ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД

ДОВЕРЯЙТЕ ЛУЧШИМ!

27 лет вместе!

Артамонов Игорь Юрьевич

ООО «Дезснаб-Трейд

Руководитель направления средств дезинфекции

МЫ В КОНТАКТЕ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ДИ ХЛОР ЭКСТРА (ТАБЛЕТКИ) 4
ДИ ХЛОР ЭКСТРА (ГРАНУЛЫ) 6
ДЕЗАКТИВ ХЛОР 8
ДЕЗАКТИВ М 10
ДЕЗАКТИВ УНИВЕРСАЛ 12
АСЕПТИК АКВА 14
АСЕПТИК СПЕЦИАЛЬ 16
АСЕПТИК СПЕЦИАЛЬ (СПРЕЙ) 18
МИКСАМИН СЕПТИК САЛФЕТКИ 20
ДЕЗАКТИВ-ГЕЛЬ 22
АСЕПТИК МЛ 24
ДВУ 5 26
МИКСАМИН 28
МИКСАМИН-АЛЬГИЦИД 30
ЭКОБИОЦИД М 32
ЭКСТРАДЕЗ 34
ДЕЗАКТИВ СЕПТИК 36
ДЕЗАКТИВ ЛЮКС 39
ДЕЗАКТИВ СПРЕЙ 42
ДЕЗАКТИВ С 45
ДЕЗАКТИВ СТИРКА 48
МИКСАМИН СЕПТИК 51
МИКСАМИН АКВА 54
МИКСАМИН ХЛОР 57
АВИЦИН 60
МИКСМЕТРИКС 62
ПРИБОР ENSURE 63
КНИГИ

КАТАЛОГ СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ

27 лет вместе!

ДОВЕРЯЙТЕ ЛУЧШИМ!

Компания ООО «Дезснаб-Трейд» основана в мае 1996 года, является членом Национальной Организации Дезинфекционистов России, входит в состав инициативной группы Совета Отечественных Производителей России.

ООО «Дезснаб-Трейд» – это современное инновационное предприятие, основной задачей, которого является разработка, производство и реализация принципиально новых высокоэффективных дезинфицирующих средств: дезинфекции, стерилизации, антисептики, дезинсекции, дератизации, моющих средств. Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании под контролем автоматических систем управления, с проверкой качества продукции в производственных лабораториях и способно выдавать более 1000 тонн готовой продукции в год. Весь производственный цикл организован в соответствии с международными стандартами ИСО 9001: 2008 и ИСО 13485: 2003.

ООО «Дезснаб-Трейд» имеет свои представительства в Красноярске, Перми, Самаре, Челябинске, Иркутске, Краснодаре, Хабаровске.

Являясь крупнейшим в России производителем высококачественных дезинфицирующих препаратов собственного производства, ООО «Дезснаб-Трейд» располагает большой линейкой лучших импортных и отечественных средств, ведущих российских и мировых производителей: средства дезинсекции и дератизации – концентраты, готовые препараты, гели, нетоксичные ловушки и клеевые массы, готовые приманки всех видов; средства дезинфекции и стерилизации, кожные антисептики, жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом; оборудование для дезинфекции и дезинсекции, средства защиты и специальную литературу.

Научным потенциалом компании совместно с НИИ дезинфектологии, другими научно-исследовательскими институтами, созданы и внедрены в производство десятки средств для дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Технология приготовления дезинфицирующих средств защищены патентами РФ. Создан и опубликован энциклопедический словарь «Дезинфекционное дело» Совместно с научными работниками ФГБУ «Учебный-научный медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации создано систематизированное справочное научное руководство «Профилактическая медицина и эпидемиология» под редакцией академика РАМН Г. Г. Онищенко и академика РАМН В. И. Покровского, «Медицинские аспекты биологической безопасности» под редакцией академика РАН и РАМН А.И. Григорьева.

Компания ООО «Дезснаб-Трейд» является дилером ведущих зарубежных и отечественных производителей, Нашими партнерами являются такие ведущие мировые производители как BASF AG, BAYER AG - Германия, CLADE - Франция, VALBRENTA CHEMICALS, KOLLANT - Италия, SULPHUR MILLS - Индия, CHEMINOVA Дания.

Об успешности и надежность нашей компании как производителя и поставщика с 15-летним, можно судить по ее клиентам. Нашими партнерами выступают Центры Гигиены и Эпидемиологии, Предприятия дезинфекционного профиля Роспотребнадзора, Санитарная служба Железной дороги, Федеральная Служба Охраны, Управление делами Президента РФ, центры крови, городские и районные больницы, авиакомпании. Продукция ООО «Дезснаб-Трейд» поставляется более чем в 2000 организаций в 300 городах России, а также в Белоруссию, Украину, Казахстан.

Несмотря на достижения в области лечебно - диагностических технологий и, в частности, технологий стационарного лечения, проблема внутрибольничной (госпитальной) инфекции по-прежнему остается одной из наиболее острых, приобретая все большую социально-экономическую значимость. О глобальном характере проблемы ВБИ и необходимости объединения усилий всех стран свидетельствует создание Всемирной ассамблеи «Безопасность пациентов», куда вошла и Россия.

Существует множество механизмов, путей и факторов объясняющих упорное существование ВБИ. Не останавливаясь подробно на их перечислении, отметим, некоторые, которые по мнению отечественных и зарубежных исследователей, наиболее существенны. Так, до 80% ВБИ передается через руки. Другой немаловажной причиной является все возрастающая агрессия инвазионных диагностических и лечебных процедур, что создает предпосылки для артифициального механизма передачи инфекций. Это хирургические операции, эндоскопические исследования, перевязки и процедуры, внутривенные и прочие вливания, которые при нарушении режима обеззараживания таят опасность заражения.

Этиологическая природа ВБИ определяется широким кругом микроорганизмов (по современным данным более 300), включающим в себя как патогенную, так и условно-патогенную флору.

В комплексе профилактических и противоэпидемических программ, по предупреждению возникновения, распространения и ликвидации ВБИ, значительная роль принадлежит строжайшему выполнению дезинфекционно – стерилизационных мероприятий направленных на уничтожении всех вегетативных и споровых форм, на объектах в стационарах, на предметах окружающих больного, стерилизации изделий медицинского назначения и обработки рук медицинского персонала. Важнейшее значение имеет и предстерилизационная очистка инструментария.

Поэтому важность подбора эффективных дезинфицирующих средств, их 100% обеспеченность - это одновременно и фактор благополучия лечебно-профилактического учреждения и фактор снижения риска внутрибольничной инфекции.

ООО «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД», понимая важность проблемы ВБИ, с учетом современных требований госпитальной эпидемиологии и экономической эффективности, предлагает линейку высокоэффективных дезинфицирующих средств собственного производства предназначенные для дезинфекции (в т.ч. высокого уровня), стерилизации и предстерилизационной очистки ИМН (хирургического и стоматологического инструмента, жестких и гибких эндоскопов), кожные антисептики, моющие антибактериальные средства.

Низкая токсичность, широкий спектр антимикробного действия, превосходные моющие свойства позволяют применять их в здравоохранении, на промышленных предприятиях (пищевая, косметическая, фармацевтическая и др.), предприятиях общественного питания и торговли, на коммунально-бытовых объектах и транспорте, в учреждениях системы образования и силовых ведомствах. Препараты также предназначены для использования населением в быту.

ДИ-ХЛОР-ЭКСТРА

НОВЫЙ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ

СОСТАВ

Действующее вещество: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 80%, а также адипиновая кислота 8%, углекислый натрий 8%, синергист, стабилизатор, вспомогательные компоненты – ПАВ, др. Массовая доля активного хлора в таблетках не менее 44%, в гранулах не менее 50%. РН рабочих растворов – 6,2.

«Ди-Хлор-Экстра» представляет собой таблетки круглой правильной формы с характерным запахом хлора или отдушки. Вес таблетки / содержание активного хлора, мг: 0,85/375; 1,7/750; 2,25/1000; 3,4/1500. Фасовка: 50, 100, 300, 305, 330, 500 таблеток, а также в блистерах по 2, 4, 8, 10, 20 таблеток и в барабанах по 40 и 50 кг. «Ди-Хлор-Экстра» обладает антимикробной активностью в отношении:

- бактерий и бацилл, в т.ч. Mycobacterium terrae, B-5, метициллен-резистентного стафилококка, ванкомицин-резистентного энтерококка, синегнойной палочки, анаэробной инфекции (тестировано на Clostridium pasterianum);
- всех известных вирусов-патогенов человека (гепатита А, В, С, Е, D), ВИЧ, полиомиелита (тестировано на вакцинном штамме LSc 2ab), всех известных возбудителей гриппа, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов Коксаки, ECHO, герпеса, цитомегалии и др.;
- грибов рода Кандида, Трихофитон; - плесневых грибов рода Аспергиллюс (Aspergillus fumigatus, A.flavus, A.niger), Пенициллиум, Мукор и их спор;
- возбудителей паразитарных болезней (цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов, в т. ч. в отношении возбудителей кишечных гельминтозов, остриций); - особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибирская язва);

Обладает спороцидной активностью, моющим, отбеливающим эффектом.

Класс опасности: 3 класс умеренно-опасных веществ при введении в желудок. 4 класс малоопасных веществ при нанесении на кожу и ингаляции. Специфические отдаленные эффекты (эмбриотропный, ганадотропный, мутагенный и канцерогенный) не выявлены.

ПРИМЕНЕНИЕ

«Ди-Хлор-Экстра» применяется в в ЛПО/ЛПУ, в других медицинских, ветеринарных, биотехнологических, химико-фармацевтических, учреждениях всех профилей и направлений; парфюмерно-косметической промышленности; в учреждениях: детских (школьных и дошкольных), социального обеспечения, образовательных, административных, культурно-развлекательных, спортивных, коммунально-бытовых служб, торговых предприятиях и общественного питания, в пищевой промышленности (производства напитков, молочной, мясной, птице-, и рыбоперерабатывающей); объектов инфраструктуры МВД, МО, МЧС и других ведомств; в др. отраслях народного хозяйства, где необходимо проводить дезинфекционные мероприятия; в быту.

«Ди-Хлор-Экстра» предназначен для проведения профилактической, текущей, заключительной дезинфекции, генеральных уборок. Дезинфекция и мытью всех видов поверхностей в помещениях и оборудования в т.ч. медицинского, др. инвентаря, скорлупы яиц, обеззараживания воздуха, дезинфекции медицинских отходов и биологических выделений всех видов, ИМН и др. инструментария.

Расход: Дезинфекция поверхностей при инфекциях бактериальной и вирусной этиологии - 1 таблетка на 10л воды разрешена в присутствии людей, при туберкулезной инфекции - 4 таблетки на 10л воды. При обработке 1м^2 поверхностей протиранием - 100мл, орошение распылителем -150мл.

Срок годности средства: - 7 лет в не вскрытой упаковке производителя. Срок годности рабочих растворов - 20 суток.

Условия хранения: в не вскрытой упаковке производителя, не требует особых условий хранения.

ДИ-ХЛОР-ЭКСТРА

СОСТАВ

Na-соль ДХЦК, адипиновая кислота и углекислый натрий, синергист, стабилизатор, вспомогательные компоненты - ПАВ (без контроля содержания в препарате) до 4%

ФАСОВКА

Средство упаковано в банки вместимостью 60 таблеток, 100 таблеток и 300 таблеток

ОПИСАНИЕ

Таблетки правильной формы или гранулы белого цвета с характерным запахом хлора. Массовая доля хлора в таблетках на менее 44%, в гранулах не менее 50%. Средство хорошо растворимо в воде, растворы прозрачны и имеют запах хлора или отдушки.

Эффективно против всех видов бактерий, вирусов, грибов, гельминтов и их яиц и личинок, особо опасных инфекций, споровых форм.

новинка
20 дней
срок годности рабочих растворов

ДИ-ХЛОР-ЭКСТРА

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ГРАНУЛЫ БЕЛОГО ЦВЕТА С ХАРАКТЕРНЫМ ЗАПАХОМ ХЛОРА ИЛИ ОТДУШКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для дезинфекции фекалии, мочи, мокроты, крови, сыворотки эритроцитарной массы, жидких выделении и других биологических жидкостей, рвотных масс, околоплодных вод при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной, грибковой этиологии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛПО/ЛПУ, др. медицинские, ветеринарные, биотехнологические, химико-фармацевтические, учреждения всех профилей и направлений; парфюмерно-косметическая промышленность; в учреждениях: детских (школьных и дошкольных), социального обеспечения, образовательных, административных, культурно-развлекательных, спортивных, коммунально-бытовых служб, торговли и общественного питания, во всех отраслях пищевой промышленности, объектах инфраструктуры МВД, МО, МЧС, др. ведомств; в др. везде, где необходимо проводить дезинфекционные мероприятия;в быту.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая туберкулез, вирусов (все известные вирусы - патогены человека), грибов рода кандида, Трихофитон, плесневых грибов родов Аспергиллюс (Aspergil-lusfumigatus, A.flavus, A.niger), Пенициллиум, Мукор и их спор, особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, спор сибирской язвы), возбудителей паразитарных болезней (цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов, в т. ч. в отношении возбудителей кишечных гельминтозов, остриций).

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Жидкие биологические выделения на поверхности засыпают гранулами, с перемешиванием и без,мокроту и фекалии на 2 часа, сыворотку крови на 4 часа, при соотношении 1:10. Подробный способ применения изложен в Инструкции.

ПРИМЕНЕНИЯ

Режимы по содержанию активного хлора от 0,015% до 3,0% с расходом количеством гранул, при разведении в 10 л воды от 3,0 г до 600,0 г.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства – 7 лет в не вскрытой упаковке производителя.

СОСТАВ

В качестве действующего вещества средство содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты не менее 80%, кроме того, в состав средства входит адипиновая кислота 8%, углекислый натрий 8%, синергист, стабилизатор, вспомогательные компоненты - ПАВ (без контроля содержания в препарате) до 4%. Массовая доля активного хлора в таблетках не менее 44%, в гранулах не менее 50%.

ФАСОВКА

Средство расфасовано в полиэтиленовые емкости от 0,5 г до 500 кг

ОПИСАНИЕ

Гранулы белого цвета с содержанием доли активного хлора не менее 50%. Расфасованы в полиэтиленовые емкости от 0,5 до 50,0 кг. Срок годности средства – 7 лет.

Используются для дезинфекции фекалии, мочи, мокроты, крови, сыворотки, эритроцитарной массы, жидких выделении и других биологических жидкостей, рвотных масс, околоплодных вод при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии, ООИ, в лечебно-профилактических учреждениях, бактериологических и клинических лабораториях, станциях переливания крови, машинах скорой медицинской помощи и пр

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Дезснаб-Трейд», Россия

ДИ-ХЛОР-ЭКСТРА

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ГРАНУЛЫ БЕЛОГО ЦВЕТА С ХАРАКТЕРНЫМ ЗАПАХОМ ХЛОРА ИЛИ ОТДУШКИ

хлорные гранулы белого цвета с содержанием доли активного хлора не менее 50%.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ЛПО/ЛПУ, др. медицинские, ветеринарные, биотехнологические, химико-фармацевтические, учреждения всех профилей и направлений; парфюмерно-косметическая промышленность; в учреждениях: детских (школьных и дошкольных), социального обеспечения, образовательных, административных, культурно-развлекательных, спортивных, коммунально-бытовых служб, торговли и общественного питания, во всех отраслях пищевой промышленности, объектах инфраструктуры МВД, МО, МЧС, др. ведомств; в др. везде, где необходимо проводить дезинфекционные мероприятия;в быту. Профилактическая, текущая, заключительная дезинфекция, генеральные уборки. Дезинфекция и мытье всех видов поверхностей в помещениях, оборудования в т.ч. медицинского, др. инвентаря, скорлупы яиц, медицинских отходов и биологических выделений всех видов, ИМН, др. инструментария, обеззараживание воздуха.

ОПИСАНИЕ:

мелкие гранулы белого цвета с запахом хлора или отдушки.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

бактерии и бациллы, в т.ч. Mycobacterium Terrae, анаэробные инфекции, др.; все известные вирусы-патогены; патогенные грибы (кандидозы, дерматофитии), плесени (Аспергиллюс, Пенициллиум, Мукор); ООИ в т.ч. сибирская язва; возбудителей паразитарных болезней в т.ч. кишечные гельминтозы.Спороцидный, моющий эффект.

СОСТАВ (ПАТЕНТ):

натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, вспомогательные компоненты (ПАВ), синергист, стабилизаторы, Массовая доля активного хлора в гранулах не менее 50%. РН рабочих растворов – 6,2.

НАЗНАЧЕНИЕ:

профилактическая, текущая, заключительная дезинфекция, генеральные уборки. Дезинфекция и мытье всех видов поверхностей в помещениях, оборудования в т.ч. медицинского, др. инвентаря, скорлупы яиц, медицинских отходов и биологических выделений всех видов, ИМН, др. инструментария.обеззараживание воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ЛПО/ЛПУ, др. медицинские, ветеринарные, биотехнологические, химико-фармацевтические, учреждения всех профилей и направлений; парфюмерно-косметическая промышленность; в учреждениях: детских (школьных и дошкольных), социального обеспечения, образовательных, административных, культурно-развлекательных, спортивных, коммунально-бытовых служб, торговли и общественного питания, во всех отраслях пищевой промышленности, объектах инфраструктуры МВД, МО, МЧС, др. ведомств; в др. везде, где необходимо проводить дезинфекционные мероприятия;в быту.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

все виды транспорта в оригинальной упаковке.

ПРИ СЛУЧАЙНОЙ РОССЫПИ ГРАНУЛ:

собрать в закрытую емкость и отправить на утилизацию. Работу проводить в перчатках и респираторе.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

не допускать попадания средства в поверхностные, подземные и сточные воды. Способ применения, подробные меры предосторожности, меры первой помощи и меры защиты окружающей среды, хранение, изложены в «Инструкции по применению дезинфицирующего средства «ДИХЛОР-ЭКСТРА».

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, НОМЕР ПАРТИИ:

см. на банке.

СРОК ГОДНОСТИ:

7 лет, рабочих растворов-20суток.

ДЕЗАКТИВ-ХЛОР

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЕ ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, всех видов изделий медицинского назначения, белья, посуды (в том числе лабораторной), игрушек, предметов ухода за больными, резиновых ковриков, уборочного инвентаря, биологических отходов, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, в учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях; на пищеблоках (дезинфекция скорлупы яиц); на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности; для заключительной дезинфекции в детских учреждениях; для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Средство обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон, спороцидным действием (сибирская язва), ООИ (чума, холера, туляремия).

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Дезинфекция поверхностей при бактериальной и вирусной инфекциях – 1 таблетка на 10 л воды, туберкулезной и грибковых инфекциях – 4 таблетки на 10 л воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Режимы: в зависимости от этиологии инфекции используются 0,015–0,300% растворы по активному хлору. Для приготовления 0,015% раствора 1 таблетку растворяют в 10 л воды.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности таблеток в не вскрытой упаковке производителя 5 лет, рабочих растворов – 2 суток.

Хранить в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя, в темном месте, отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

ДЕЗАКТИВ-ХЛОР

СОСТАВ

В качестве действующего вещества средство содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты – 84,0%. Кроме того, в состав средства входит адипиновая кислота – 8,0%, углекислый натрий – 8,0%

ФАСОВКА

Средство упаковано в банки из полимерных материалов с плотно закрывающимися крышками, вместимостью 60 таблеток, 100 таблеток и 300 таблеток.

ОПИСАНИЕ

Средство представляет собой таблетки белого цвета, круглой правильной фомы весом 3,32±0,18 г. Средство хорошо растворимо в воде. При растворении 1 таблетки в воде выделяется 1,52±0,12 г активного хлора (АХ)

ДЕЗАКТИВ-М

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

НАЗНАЧЕНИЕ

- В ЛПУ, акушерских стационарах, включая отделения неонатологии, клинических, микробиологических и др. лабораториях, инфекционных очагах;
- Для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, инкубаторов (кувезов) и приспособлений к ним, санитарно-технического оборудования, мусоросборников, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, обуви из резин, пластика и других полимерных материалов, игрушек, белья, посуды столовой и лабораторной (в т. ч. однократного применения);
- Медицинских отходов классов Б и В;
- Дезинфекции на санитарном транспорте;
- Генеральных уборок в ЛПУ и детских учреждениях;
- Дезинфекции ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной – перед ДВУ эндоскопов) очисткой ИМН; предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией ИМН, включая хирургические и стоматологические инструменты из различных материалов, а также жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним; окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня;
- На предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в учреждениях культуры, отдыха, спорта, кинотеатрах, офисах и др., учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях, предприятиях общественного питания и торговли для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, предметов ухода, средств личной гигиены, обуви (из резин, пластика и других полимерных матералов), инструментов (парикмахерских и косметичских), отходов (изделия однократного применения: салфетки, ватные шарики, шапочки, простыни, накидки, инструменты и пр.), систем мусороудаления (мусоросборников, мусоровозов и мусороуборочного оборудования), транспорта для перевозки пищевых продуктов;
- Аэрозольная обработка помещений;
- Для профилактической дезинфекции и дезинфекции по эпидпоказаниям систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, легионеллеза), вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дезинфекция, в т. ч. совмещенная с предстер илизационной очисткой, изделий медицинского назначения, ручным и механическим способом: 3% – 30 мин.;
- Объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях: концентрации от 0,2 до 3,0% в течение 60 мин.;
- Систем вентиляции и кондиционирования воздуха: от 0,3 до 2,0%, 60 мин. Режимы: в зависимости от этиологии инфекции.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства в не вскрытой упаковке производителя 5 лет, рабочих растворов – 14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.

ДЕЗАКТИВ-М

СОСТАВ

В качестве действующего вещества смесь четвертичных аммониевых солей (суммарно): алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид – 10,0%; кроме того, в состав средства входят метасиликат натрия, неионогенное поверхностно-активное вещество и др.; pH средства – 12,0

ФАСОВКА

Флакон 1 л, канистры 5 л, 10 л

ОПИСАНИЕ

Представляет собой прозрачный жидкий концентрат желтого цвета со специфическим запахом

ДЕЗАКТИВ УНИВЕРСАЛ

ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПСО, ДВУ, СТЕРИЛИЗАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Концентрат-жидкость от бесцветного до желтоватого цвета с запахом отдушки.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

бактерии и бациллы, в т.ч. Mycobacterium terrae, Mycobacterium Avium, В-5, ВБИ инфекции, в т.ч. анаэробные, др.; все известные вирусы-патогены; патогенные грибы (кандидозы, дерматофитии), плесени (Аспергиллюс, Пенициллиум, Мукор); ООИ в т.ч. туляремия, чума, холера, сибирская язва; возбудителей паразитарных болезней, в т.ч. кишечные гельминтозы. Моющие и дезодорирующие свойства, не фиксирует органические загрязнения.

СОСТАВ

глутаровый альдегид, глиоксаль, смесь ЧАС, вспомогательные функциональные компоненты. pH 1% раствора средства 4,5.

НАЗНАЧЕНИЕ

профилактическая, текущая, заключительная дезинфекция, генеральные уборки; дезинфекция поверхностей в помещениях, предметов обстановки, аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, средств личной гигиены, предметов ухода за больными.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

всех видов медицинских отходов и всех видов биологического материала; транспорта; дезинфекция, ДВУ, стерилизация ИМН любого назначения, в т. ч. эндоскопической техники; дезинфекция ручным и механизированным способом ИМН, в т.ч. совмещенная с ПСО;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

в ЛПО/ЛПУ, в других медицинских, ветеринарных, химико-фармацевтических, биотехнологических учреждениях всех профилей и направлений; в учреждениях социального обеспечения, образовательных, административных, торговых предприятий и общественного питания, культурно-развлекательных, коммунально-бытовых служб, объектов инфраструктуры МВД, МО, МЧС и других ведомств.

ТРАНСПОРТИРОВКА

все виды транспорта в оригинальной упаковке.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

не допускать попадания средства в поверхностные, подземные и сточные воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

подробные меры предосторожности, меры первой помощи и меры защиты окружающей среды изложены в «Инструкции по применению дезинфицирующего средства «ДЕЗАКТИВ УНИВЕРСАЛ».

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Дата изготовления, номер партии: см. на фасовке.

Срок годности средства составляет 5 лет, раб/растворов - 41 сутки

ДЕЗАКТИВ УНИВЕРСАЛ

СОСТАВ

глутаровый альдегид - 1,0%, глиоксаль - 7,0%, смесь ЧАСов суммарно - 25,5%, вспомогательные компоненты, pH 1% раствора - 4,5.

НАЗНАЧЕНИЕ

Дезинфекция поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, дезинфекция медицинских отходов (класса А, Б, В); всех видов биологического материала.

Дезинфекция совмещенная с ПСО ИМН в т.ч. эндоскопического оборудования ручным и механизированным способами, ДВУ и стерилизация.

ФАСОВКА

флаконы по 1 л., канистры по 5 л.

ОПИСАНИЕ

Прозрачная жидкость от бесцветной до желтоватого цвета с запахом отдушки.

Дезактив-Универсал отличается высокой антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов **в т.ч. Mycobacterium terrae**, возбудителей ВБИ и аэробных инфекций; всех известных патогенных вирусов (ВИЧ-инфекция, гепатиты, в т.ч. гепатит В, «птичий грипп H5N1, H7N3, H9N2», «атипичная пневмония» (SARS), др. вирусы; грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. Обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц), моющим и дезодорирующим эффектом.

41 день
срок годности рабочих растворов

АСЕПТИК-АКВА

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приемах родов;
- Для обработки кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов пациентов и доноров в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ);
- Для гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ, санаторно-курортных и медицинских учреждений, медико-диагностических и биохимических лабораторий, медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, пенитенциарных учреждений, работников дезинфекционных станций; работников парфюмерно-косметических и микробиологических предприятий, предприятий пищевой промыш-ленности, общественного питания и розничной торговли (в т. ч. кассиров и др. лиц, работающих с денежными купюрами), коммунальных служб (в т. ч. парикмахерских, косметических салонов и других);
- Для гигиенической обработки рук, обработки кожи инъекционных полей населением в быту.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т. ч. микобактерий туберкулеза, вирусов, в т. ч. ВИЧ-инфекции, гепатитов, полиомиелита, патогенных грибов, возбудителей кандидозов и дерматофитий. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу в течение 30 секунд;
- Обработка рук хирургов и др. лиц, участвующих в проведении операции: перед применением средства руки моют теплой проточной водой с кусковым или жидким туалетным мылом или другими средствами в течение 2 минут. Тщательно высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем 5 мл средства наносят на кисти рук и втирают его в кожу в течение 2,5 минут дважды, поддерживая руки во влажном состоянии в течение 5 минут;
- Обработка операционного поля и локтевых сгибов доноров: кожу последовательно двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки – 2 минуты;
- Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки – 1 минута.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя 3 года.

Хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых складских помещениях при температуре не ниже -5°С и не выше +35°С.

АСЕПТИК-АКВА

СОСТАВ

Алкилдиметиламмоний хлорид 0,12%, дидецилдиметиламмоний хлорид 0,18%, функциональные добавки (аллантоин, гель алоэ-вера, увлажняющие компоненты, буферная смесь, парфюмерная отдушка, вода до 100%

ФАСОВКА

Флакон 100 мл, 1 л и 5 л.

ОПИСАНИЕ

Готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным парфюмерным за-пахом. Сохраняет эффективность при замораживании и последующем оттаивании

АСЕПТИК-СПЕЦИАЛЬ

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ, медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников парфюмерно-косметических предприятий, санаторно-курортных учреждений, предприятий общественного питания, объектов коммунальных служб (в т. ч. парикмахерских, косметических салонов и других);
- Для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приемах родов, а также для обработки кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов пациентов в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и населением в быту (согласно этикетке для сбыта).

МИКРОБИОЛОГИЯ

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т. ч. микобактерий туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатита А, полиомиелита), дрожжеподобных грибов рода Кандида. Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 2 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу в течение 30 секунд;
- Обработка рук хирургов и др. лиц, участвующих в проведении операции: перед применением средства руки моют теплой проточной водой с кусковым или жидким туалетным мылом или другими средствами в течение 2 минут. Тщательно высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем 5 мл средства наносят на кисти рук и втирают его в кожу в течение 2,5 минут, поддерживая руки во влажном состоянии в течение 5 минут;
- Обработка операционного поля и локтевых сгибов доноров: кожу последовательно двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки – 2 минуты;
- Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки 1 минута.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя 3 года.

Хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых складских помещениях при температуре не ниже +10 °С и не выше +30 °С.

АСЕПТИК-СПЕЦИАЛЬ

СОСТАВ

Алкилдиметилбензиламмоний хлорида (0,15%), изопропиловый спирт (63%), смягчающие добавки, отдушка, вода деминерализованная до 100%

ФАСОВКА

Флакон 100 мл, 1 л и 5 л с распылителем

ОПИСАНИЕ

Средство представляет собой готовую к применению бесцветную, прозрачную жидкость с запахом, характерным для изопропанола

АСЕПТИК-СПЕЦИАЛЬ (спрей)

ГОТОВОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ВИДЕ СПРЕЯ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Экстренная дезинфекция небольших по площади и труднодоступных для обработки поверхностей, требующих быстрого обеззараживания и высыхания, предметов обстановки, медицинского оборудования, др., в ЛПУ, в детских учреждениях и соцобеспечения, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах, предприятиях химико-фармацевтической, биотехнологической, пищевой промышленности, в ветеринарии, др. отраслях, на санитарном транспорте. Дезинфекция рук хирурга, медперсонала, операционного и инъекционного полей.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), ВИЧ-инфекции, гепатита «А», полиомиелита), патогенных грибов возбудителей кандидозов и дерматофитий.

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Способы обеззараживании: орошением и протиранием с экспозицией от 1 до 10 мин. в зависимости от вида инфекции. Норма расхода при орошении – 30мл/м^2, при протирании 50 мл/м^2.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства - 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

Средство хранить в крытых вентилируемых складских помещениях в плотно закрытой упаковке производителя, в соответствии с правилами хранения легковоспламеняющихся жидкостей, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям при температуре от -5 °С до + 30 °С, вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м), открытого огня и прямых солнечных лучей.

СОСТАВ

В состав средства входят в качестве действующих веществ: изопропиловый спирт - 63.0±2,0%; алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,15±0,03%, а также функциональные компоненты и отдушка.

ФАСОВКА

Средство выпускается в полимерных емкостях с триггерной головкой-распылителем, вместимостью 0.5 л.

ОПИСАНИЕ

Средство представляет собой готовую к применению, бесцветную или слегка желтоватую жидкость с характерным запахом изопропанола.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Дезснаб-Трейд», Россия

АСЕПТИК-СПЕЦИАЛЬ (спрей)

СОСТАВ

в состав средства входят в качестве действующих веществ: изопропиловый спирт - 63.0±2,0%; алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,15±0,03%, а также функциональные компоненты и отдушка.

ОПИСАНИЕ

с редство представляет собой готовую к применению, бесцветную или слегка желтоватую жидкость с характерным запахом изопропанола.

ФАСОВКА

Флакон с распылителем 500 мл.

МИКСАМИН-СЕПТИК

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ВИДЕ САЛФЕТОК

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовые для однократного применения салфетки из нетканого плотного материала белого цвета со специфическим запахом спирта и отдушки, для обеззараживания рук медицинского персонала, для обеззараживания кожи инъекционного поля, для обработки локтевых сгибов доноров, для обеззараживания перчаток, для дезинфекции небольших по площади и труднодоступных поверхностей

МИКРОБИОЛОГИЯ

Средство обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулёза - тестировано на M. Terrae) и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью (включая энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию; энтеровирусные инфекции – полиомиелит, Коксаки, ЕСНО; грипп, в том числе грипп H1N1, H5N1; ОРВИ, герпетическую, аденовирусную и др. инфекции), фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов. Средство обладает пролонгированным действием в течение 5 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для гигиенической обработки рук, время обработки не менее 30 секунд;
- для обработки инъекционного поля время обработки не менее 20 секунд;
- для обработки перчаток, надетых на руки персонала. Общее время обработки 30 секунд (по 15 секунд на каждую перчатку). Время дезинфекционной выдержки – 5 мин.
- для обработки небольших по площади поверхности одной салфеткой способом протирания можно обработать площадь 0,2 м2 (40×50) при времени обработки в течение 15 секунд и времени обеззараживания: при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза) - в течение не менее 1 мин.; по туберкулезу (тестировано на M. Terrae) и дерматофитиях - в течение не менее 10 мин.; по вирусным инфекциям - в течение не менее 5 мин.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности – 3 года с даты изготовления в невскрытой упаковке изготовителя, при соблюдении правил хранения. Хранить в невскрытой упаковке изготовителя в крытых сухих вентилируемых складских помещениях, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, в дали от нагревательных приборов, при температуре от 0 до +30^{0}C

МИКСАМИН-СЕПТИК

СОСТАВ

СОСТАВизопропиловый спирт (2-пропанол) – 60%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,25%, полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид - 0,25%, а также функциональные добавки и ухаживающие за кожей компоненты.

ОПИСАНИЕ

готовые для однократного применения салфетки из нетканого плотного материала белого цвета со специфическим запахом спирта и отдушки, пропитанные дезинфицирующим раствором и упакованные и индивидуальные герметичные пакеты.

ФАСОВКА

в индивидуальной упаковке «саше», в пачке по 5,7,10,12,15,30,50,100, 200,1000 штук.

ДЕЗАКТИВ ГЕЛЬ

АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для гигиенической обработки рук медицинского персонала, для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, для обеззараживания кожи инъекционного и операционного поля, для обеззараживания локтевых сгибов доноров;

МИКРОБИОЛОГИЯ

Обладает активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая Mycobacterium terrae), эффективно при инфекциях, вызванных особо устойчивыми возбудителями внутрибольничных инфекций, вирулицидной активностью, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов, плесеней.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук: 2-5 мл средства «ДЕЗАКТИВ-ГЕЛЬ» наносят на сухие кисти рук (без предварительного мытья водой и мылом) и втирают в кожу, не менее 30 сек.

  Для профилактики туберкулеза и вирусных инфекций обработку рук проводят дважды, используя каждый раз не менее 2,5 мл средства, общее время обработки не менее 1 мин.

- Обработка рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов: перед применением средства кисти рук и предплечья в течение двух минут моют теплой проточной водой и туалетным мылом, а затем высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят 5 мл средства и втирают его в кожу рук (ладонные, тыльные поверхности, межпальцевые промежутки обеих рук, обращая особое внимание на кончики пальцев и околоногтевые ложа) и предплечий в течение 2,5 мин; после этого снова наносят 5 мл средства на кисти рук и втирают его в кожу кистей рук и предплечий в течение 2,5 мин, поддерживая руки во влажном состоянии в течение всего времени обработки. Общее время обработки составляет 5 мин. Стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства.

  Средство обладает пролонгированным действием при обработке рук хирургов в течение 5 часов.

- Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов: кожу протирают двукратно раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки - 2 мин.

- Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки -30 с.

- Профилактическая обработка ступней ног: обильно смочить ватный тампон (не менее 2,5 мл на каждый тампон) и тщательно обработать каждую ступню ног разными ватными тампонами, время выдержки после обработки каждой ступни – не менее 2 мин.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в упаковке изготовителя в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, при температуре от 0°С до плюс 35°С. отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. Срок годности 5 лет.

ДЕЗАКТИВ ГЕЛЬ

СОСТАВ

Изопропиловый спирт-35,0%, н-пропиловый спирт-30,05%, а также функциональные добавки, смягчающие и увлажняющие компоненты для кожи рук, в том числе гиалуронат натрия (гиалуроновую кислоту).

ОПИСАНИЕ

Готовое дезинфицирующее средство в виде бесцветной прозрачной жидкости в виде геля.

ФАСОВКА

во флаконах по 500мл с дозатором

АСЕПТИК-МЛ

ЖИДКОЕ МЫЛО С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для гигиенической обработки рук хирургов, медицинского персонала перед обработкой антисептическим средством;
- Для гигиенической обработки рук медицинского персонала в ЛПУ, скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в т. ч. бактериологических, микологических, иммунологических, клинических и пр.);
- Для гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников парфюмерно-косметических и фармацевтических предприятий, персонала санаторно-курортных учреждений, предприятий общественного питания и пищевой промышленности (мясная, молочная, птицеперерабатывающая и др.), торговли, объектов коммунальных служб (в т. ч. парикмахерских, косметических салонов и других);
- Для санитарной обработки кожных покровов пациентов ЛПУ, включая лежачих больных в отделениях гариатрического, онкологического профиля, хосписах, домах-интернатах для инвалидов и лиц пожилого возраста, учреждениях социальной защиты;
- Для применения населением в быту.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Эффективно в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т. ч. возбудителей внутрибольничных инфекций), микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида и дерматофитий.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства наносят на влажные кисти рук и образовавшейся пеной обрабатывают руки в течение 1 минуты, затем пену хорошо смывают водой;
- Санитарная обработка кожных покровов: 5 мл средства нанести на влажную мочалку и оставшейся пеной обработать кожу (кроме волосистой части головы), затем пену тщательно смыть водой. Время обработки не менее 2 минут.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя 3 года.

Хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых складских помещениях при температуре не ниже +10°С и не выше +30°С.

АСЕПТИК-МЛ

СОСТАВ

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,8–1,2%, натрий лаурилсульфат, кокамидопропилбетаин, хлористый натрий, аллантоин, бензиловый спирт, консервант, отдушка, вода до 100%

ФАСОВКА

Флакон 500 мл с дозатором, 1 л, 5 л

ОПИСАНИЕ

Вязкая однородная жидкость с характерным парфюмерным запахом. Обладает смягчающими и увлажняющими кожу свойствами

ДВУ–5

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ);
- Дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования, лабораторной посуды (включая однократного использования), предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, резиновых ковриков, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в ЛПУ, в клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте; при проведении генеральных уборок; аэрозольная обработка больших помещений методом горячего тумана;
- Дезинфекция, в том числе совмещенная с предстерилизационной очисткой, ручным и механическим способом, изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним в ЛПУ;
- Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов в ЛПУ;
- Стерилизация изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним в ЛПУ.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода кандида и трихофитон, а также спороцидными и моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дезинфекция поверхностей при бактериальной инфекции – 0,04%, вирусной и туберкулезной инфекциях – 0,2%;
- Дезинфекция объектов при проведении генеральных уборок в ЛПУ: концентрации от 0,2% в течение 90 минут;
- Дезинфекция, в том числе совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним): 1% – 30 минут;
- Дезинфекция высокого уровня: 3% – 10 минут, 5% – 5 минут;
- Стерилизация: 3% – 60 минут, 5% – 30 минут.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя 5 лет, рабочих растворов - 14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.

Хранить в упаковке изготовителя, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня. Отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.



ДВУ–5

СОСТАВ

В качестве действующих веществ входят четвертичное аммониевое соединние (ЧАС): дидецилдиметиламмоний хлорид – 35% и глутаровый альдегид (ГА) – 10%

ОПИСАНИЕ

Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета со специфическим запахом

ФАСОВКА

Флакон 1 л, канистра 5 л

МИКСАМИН

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции; дезинфекции медицинских отходов группы Б и В;
- Для дезинфекции, в т. ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (в том числе хирургических и стоматологических инструментов) ручным способом; предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов ручным способом; предварительной и предстерилизационной очистки инструментов к эндоскопам ручным способом;
- Для проведения генеральных уборок в ЛПУ, детских учреждениях (в том числе неонатологических отделениях);
- Для дезинфекции кувезов для недоношенных детей;
- Для дезинфекции объектов автотранспорта, включая салоны санитарного транспорта;
- Для проведения профилактической дезинфекции систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы);
- Для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D;
- Для обеззараживания поверхностей, пораженных плесневыми грибами рода Аспергиллюс.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза, анаэробных, особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, в т. ч. спор), вирусов (в т. ч. вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т. ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа HINI, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и Аспергиллюс, обладает моющими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Режимы: в зависимости от этиологии инфекции от 0,05%.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет, рабочих растворов – 28 суток. Средство сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаивания.

МИКСАМИН

СОСТАВ

Комплекс четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) – 10%, N, N-бис (3-аминопропил) додециламин – 3%, а также поверхностно-активные вещества и другие вспомогательные компоненты (синергисты биоцидов, ингибитор коррозии, пеногаситель, водоумягчитель, отдушка, краситель и деминерализованная вода)

ОПИСАНИЕ

Представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета со слабым специфическим запахом

ФАСОВКА

Флакон 1 л, канистра 5 л

МАКСИСАН-АЛЬГИЦИД

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РОСТА ВОДОРОСЛЕЙ В ВОДЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

предназначено для быстрого и эффективного предотвращения роста водорослей в бассейнах. Обладает эффектом осветления воды. Не содержит хлора и тяжелых металлов. Пригоден для любого типа бассейнов (в том числе SPA)

Рекомендуемые дозировки:

- предварительная обработка бассейна перед заполнением водой: на стены и дно бассейна (для дезинфекции и образования защитного слоя) нанести раствор средства 200 мл на 10 воды и дать высохнуть. Не смывать!
- первая обработка (после заполнения бассейна водой): на 10м^3 воды добавить 150 мл совместно с хлорным дезинфектантам («МАКСИСАН»/«МАКСИСАН-ЛОНГ»). Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр тщательно промыть.
- текущая обработка: на 10м^3 воды добавить 50 мл (открытый бассейн) или 30 мл на 10м^3 воды (закрытый бассейн) средства один раз 3 дня.
- заросший водорослями бассейн: сначала обработать с помощью быстрорастворимых таблеток «МАКСИСАН» 20 таблеток, затем (лучше через 10-12 часов) добавить 250 мл на 10м^3 воды «МАКСИСАНа – АЛЬГИЦИДа». Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 18 часов при непрерывной фильтрации. Затем фильтр тщательно промыть.

Дополнительное назначение: Рабочий раствор средства (на 20 мл «МАКСИСАНа-АЛЬГИЦИДа» - 980 мл воды) может применяться для антигрибковой обработки пластиковых и резиновых дорожек, настилов, кафельных кромок.

Меры предосторожности: Не допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к химическим средствам и хроническими аллергическими заболеваниями. При работе со средством использовать защиту рук резиновыми перчатками. Беречь от детей! Не принимать внутрь. Не смешивать с другими химическими средствами. При попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу!

МИКРОБИОЛОГИЯ

Обладает Бактерицидной, Фунгицидной и Альгицидной активностью.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства 5 лет с даты изготовления. Хранить в сухом проветриваемом помещении в герметично закрытой упаковке при температуре от -32 до +35 градусов. Беречь от нагрева и прямых солнечных лучей.

МАКСИСАН-АЛЬГИЦИД

СОСТАВ

в качестве действующего вещества смесь четвертично аммониевых соединений (суммарно) – 10% и вспомогательные компоненты.

ЭКОБИОЦИД-М

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, обуви из резин, пластика и других полимерных материалов, изделий медицинского назначения, игрушек (кроме мягких), предметов ухода за больными, посуды (столовой, лабораторной), белья, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря, медицинских отходов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и особо опасные инфекции – чуму, холеру, туляремию, сибирскую язву), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, а также жидких выделений при сибирской язве при проведении заключительной, текущей и профилактической дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), инфекционных очагах, в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, на санитарном транспорте, проведения генеральных уборок, а та же профилактической дезинфекции на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, прачечные, промышленные рынки, общественные туалеты), учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, кинотеатры и др.), учреждениях пенитенциарных и социального обеспечения, предприятиях общественного питания и торговли.

- Для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных и пчел.
- Для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей особо опасных инфекций – сибирской язвы, чумы, холеры, туляремии), вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон, спор бацилл.

ПРИМЕНЕНИЕ

Режимы: в зависимости от этиологии инфекции от 0,5 до 4%.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя 2 года, при условии хранения в темном прохладном помещении, срок хранения рабочих растворов – 5 дней.

ЭКОБИОЦИД-М

СОСТАВ

Перекись водорода (ПВ) – 30,0%, и алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 1,2% и вспомагательные компоненты

ОПИСАНИЕ

Представляет собой бесцветную прозрачную или опалесцирующую жидкость со слабым специфическим запахом

ФАСОВКА

Флакон 1 л,
канистра с клапаном для снятия избыточного даления 4л

ЭКСТРАДЕЗ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты и инструменты к гибким эндоскопам);
- Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной или окончательной (перед дезинфекцией высокого уровня – ДВУ) очисткой, гибких и жестких эндоскопов;
- Для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стомато-логические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним), а также окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ в лечебно-профилактических учреж-дениях;
- Для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, белья, посуды, в том числе лабораторной (включая посуду однократного использования), предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, игрушек при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях, акушерских стационарах (кроме отделений неонатологии), в клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте;
- Для проведения генеральных уборок;
- Для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции помещений, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования на любых стационарных и подвижных объектах железнодорожного транспорта и метрополитена России, включая вокзалы, станции метрополитена, железнодорожные вагоны пассажирских составов различного типа, служебные и специального назначения вагоны, вагоны-рестораны, вагоны метрополитена, буфеты и другие объекты ведомственного подчинения.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов родов Кандида, Трихофитон, а также моющими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Режимы: в зависимости от этиологии инфекции от 0,05% до 3,0%.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя 5 лет, рабочих растворов – 14 суток.

ЭКСТРАДЕЗ

СОСТАВ

Смесь четвертичных аммониевых солей (ЧАС) и вспомогательных компонентов. Суммарное содержание ЧАС – 50%

ФАСОВКА

Флакон 1 л, канистры 5 л, 10 л

ОПИСАНИЕ

Средство представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета со слабым специфическим запахом

ДЕЗАКТИВ СЕПТИК

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО (КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК)

ОПИСАНИЕ:

Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости или с цветом применяемого красителя с характерным запахом спирта и (или) применяемой отдушки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

* в учреждениях здравоохранения всех видов и направлений, включая родильные стационары, отделения новорожденных, неонатальные центры и отделения, детские отделения, стоматологические клиники и отделения, эндоскопические и колоноскопические отделения, медицинские кабинеты и медпункты различных учреждений, кабинеты диагностики, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые центры, центры по трансплантации органов, станции переливания и забора крови, противотуберкулезные (или фтизиатрические) учреждения, кожно-венерологические диспансеры, микологические и др.
* на санитарном транспорте всех видов, в т.ч. в условиях транспортировки в машинах скорой помощи;
в учреждениях дезинфекционного профиля, включая санпропускники;
* в лабораториях (в т.ч. бактериологических, вирусологических, микологических, иммунологических, клинических, диагностических и др.);
* в зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и инфекционных очагах;
* в учреждениях и ведомствах: МЧС, МВД, ВС РФ и формирований ГО;
* объектах водоканала и энергосети, на предприятиях парфюмерно-¬косметической, химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности, на ветеринарных объектах, птицеводческих, животноводческих, звероводческих хозяйствах; на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, торговли;
* в детских дошкольных и школьных учреждениях, административных объектах, учреждениях соцобеспечения, коммунально-бытового обслуживания, сферы услуг, в торгово-развлекательных центрах, на объектах служб ритуальных услуг, моргов и т.д.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулёза – тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей внутрибольничной инфекции (ВБИ) – тестировано на Pseudomonas aeruginosa); кишечных инфекций – Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, метициллин-резистентного стафилококка и ванкомицин-резистентного энтерококка, всех известных вирусов – патогенов человека (в том числе рино-, норо-, рото-, аденовирусов, вирусов энтеральных и парентеральных), гепатитов, включая гепатиты А, В, С, D; полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, вирусов гриппа, в т.ч. «свиного» H1N1 и «птичьего» H5N1, парагриппа, коронавирусов, возбудителя «атипичной пневмонии» (SARS, MERS), герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, цитомегаловирусной инфекции и т.д., фунгицидная активность в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.

СОСТАВ:

В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт – 70%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид- 0,1%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,1%,
а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, подготовленную воду.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке производителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания не разбавленного препарата в поверхностные, грунтовые и сточные воды.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» предназначено для:

- гигиенической обработки рук медицинского персонала;
- гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических, фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятий, коммунально-бытовых служб, служб ритуальных услуг, моргов, общественного транспорта, общественного питания, молочной кухни, рынков, пищевой и перерабатывающей промышленности, птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и звероводческих хозяйств, предприятий торговли (в т.ч. кассиров и других лиц, работающих с денежными купюрами);
- обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств, в медицинских организациях (в том числе стоматологических организациях, а также при приеме родов в родильных домах и др.);
- обработки кожи инъекционного поля пациентов, в т.ч. при проведении прививок;
- обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях переливания и забора крови и др.;
- обработки кожи операционного поля, в т.ч. при катетеризации и пункции суставов и органов, проведением проколов, рассечений, биопсии в ЛПУ.
- частичной санитарной обработки кожных покровов, включая лежачих больных;
- обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
- обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и других материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала, в т.ч. в случае попадания на перчатки инфекционного материала;
- с целью экспресс-дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях (пол, стены и др.);
- предметов обстановки, поверхностей приборов и аппаратов
- поверхностных (накожных) датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п) и других аналогичных медицинских изделий, допускающих обеззараживание способом протирания:
- кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электродов для грудных отведений);
- изделий медицинского назначения (кроме хирургических ИМН, а так же ИМН, имеющих полости и каналы) из различных материалов (металла, стекла, пластмассы, резины), включая медицинские тонометры, рентген-кассеты, манжеты тонометров, стетоскопы, фонендоскопы и светофонендоскопы, стоматологические инструменты (кроме вращающихся), стоматологические наконечники;
- внутренней поверхности обуви (из резины и пластика) с целью профилактики грибковых заболеваний и удаления неприятных запахов;
- счетчиков банкнот и монет, детекторов валют и акцизных марок, уничтожителей документов, архивных шкафов и стеллажей;
- систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры, воздуховоды, вентиляционные фильтры и др.);
- окрашенное в цвет красителя, средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» предназначено для визуализации обработанной поверхности кожи пациента:
- для обработки кожи и обозначения границ операционного и инъекционного полей пациентов в медицинских учреждениях, в машинах скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ № 10/21 по применению дезинфицирующего средства «Дезактив Септик»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л, флаконы с распылителем 0,5 и 0,75 л.

ДЕЗАКТИВ СЕПТИК

ОПИСАНИЕ:

Представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости или с цветом применяемого красителя с характерным запахом спирта и (или) применяемой отдушки.
Эффективно в отношении всех видов бактерий (тестировано на M. Terrae), кишечных инфекций, всех известных вирусов – патогенов человека (в том числе коронавирусов в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л, флаконы с распылителем 0,5 и 0,75 л.

СОСТАВ:

Содержит изопропиловый спирт – 70%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид- 0,1%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,1%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, подготовленную воду.

ДЕЗАКТИВ ЛЮКС

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

ОПИСАНИЕ:

Средство дезинфицирующее «ДЕЗАКТИВ ЛЮКС» представляет собой прозрачную жидкость желтоватого оттенка с запахом применяемой отдушки. Допускается наличие опалесценции и незначительного осадка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

В медицинских организациях (МО) и учреждениях (в том числе акушерско-гинекологического профиля, включая отделения неонатологии, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, бюро судебно-медицинской экспертизы, станциях переливания крови и скорой медицинской помощи и т.д.), лабораториях широкого профиля, соответствующих подразделений силовых ведомств; а также детских (школьных и дошкольных), объектах социального обеспечения, предприятиях коммунально-бытового обслуживания, общественного питания и торговли, образования, культуры, спорта, пищевой промышленности, парфюмерно-косметической промышленности, химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности, ветеринарных учреждениях, дезинфекционных станциях и других учреждениях, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

В отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая микобактерии туберкулеза (тестировано на Mycobacterium terrae), возбудителей внутрибольничных инфекций (тестировано на Pseudomonas aeruginosa), особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия); вирусов (включая все известные вирусы-патогены человека, в том числе вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов (гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусы, вирусы «атипичной пневмонии» (SARS), коронавирусы, «птичьего» гриппа А/Н5№1, «свиного» гриппа А/HINI, гриппа человека, герпеса, ротавирусы, норовирусы, возбудители ОРВИ, парагриппа, цитомегалии и др.); грибов рода Кандида и дерматофитов, плесневых грибов рода Аспергиллюс; средство эффективно в отношении возбудителей паразитарных болезней (цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов, в т.ч. в отношении возбудителей кишечных гильминтозов, остриций).

СОСТАВ:

В качестве действующих веществ содержит комплекс алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид суммарно не менее 16,0%, N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 9,0%, а также вспомогательные компоненты: смесь неионогенных ПАВ, отдушка, краситель и воду.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке производителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания не разбавленного препарата в поверхностные, грунтовые и сточные воды.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» предназначено для:
- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов; санитарно-технического оборудования, белья, посуды, кухонного оборудования и инвентаря, резиновых и полипропиленовых ковриков, уборочного инвентаря и спортивного инвентаря, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены в МО, в детских и пенитенциарных учреждениях, в инфекционных очагах при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции, в том числе в очагах особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии);
- дезинфекции кувезов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно¬дыхательной и ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, датчиков к аппаратам УЗИ;
- дезинфекции медицинских отходов класса Б и В,
- дезинфекции биологических выделений всех видов
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, стоматологических материалов: оттисков из альгинатных и силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, артикуляторов, съемных частей отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения из металлов, стекла, пластмасс и резины (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, зеркала с амальгамой, контуры наркозно-дыхательной аппаратуры, аппараты искусственной вентиляции легких, анестезиологического оборудования, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним), инструментов, используемых для маникюра, педикюра, чистки лица и других косметических процедур, ручным способом и механизированным (в ультразвуковых установках любого типа);
- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной или окончательной очисткой (перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) или стерилизацией гибких и жестких эндоскопов ручным и механизированным (в специализированных установках отечественного и импортного производства, например «КРОНТ-УДЭ») способами);
- проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях и организациях, на коммунальных объектах, в пенитенциарных и других учреждениях и организациях;
- обеззараживания объектов, пораженных плесневыми грибами ;
- дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах;
- проведения профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы, мусорные баки, мусоропроводы);
- использования для пропитывания дезковриков , дезматов и дезбарьеров;
- обеззараживание (дезинвазия) объектов внешней среды, контаминированных возбудителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками гельминтов)
- обеззараживания поверхности скорлупы пищевых яиц.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ № 11/21 по применению дезинфицирующего средства «Дезактив Люкс»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л

ДЕЗАКТИВ ЛЮКС

ОПИСАНИЕ:

Представляет собой прозрачную жидкость желтоватого оттенка с запахом применяемой отдушки. Допускается наличие опалесценции и незначительного осадка. Эффективно отношении бактерий всех видов (тестировано на M. terrae), особо опасных инфекций, всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе коронавирусов, грибов и дерматофитов, плесневых грибов, возбудителей паразитарных болезней.

СОСТАВ:

Содержит комплекс алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид суммарно не менее 16,0%, N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 9,0%, а также вспомогательные компоненты: смесь неионогенных ПАВ, отдушка, краситель и воду.

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л

ДЕЗАКТИВ СПРЕЙ

ОПИСАНИЕ:

Средство «Дезактив Спрей» представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость со слабым характерным запахом спирта и применяемой отдушки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе в стоматологических кабинетах, приемных отделениях, реанимационных, операционных, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема , на станциях переливания крови, детских стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии) и т.п.), в детских дошкольных и школьных учреждениях; в клинических, микробиологических и др. лабораториях; на объектах коммунального хозяйства (парикмахерских, массажных и косметических салонах, салонах красоты, гостиницах, общежитиях, учреждениях соцобеспечения, банях и др.); на биотехнологических и фармацевтических предприятиях (кроме помещений класса А – стерильных).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в т.ч. микобактерии туберкулеза (штамм M.Terrae), эффективно при инфекциях, вызванных особо устойчивыми возбудителями внутрибольничных инфекций, вирулицидной активностью в отношении всех известных вирусов-патогенов человека (энтеральных и парентеральных гепатитов: гепатита А, В, С, Е, D), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека (H5N2, H7N3, H9N2»), вирусы Коксаки, ECHO, герпеса, цитомегалии и др.); фунгицидной активностью, в том числе в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов рода Аспергиллюс. Средство «Дезактив-Спрей» активно разрушает на поверхностях биологические пленки, а так же обладает прекрасными моющими свойствами.

СОСТАВ:

В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт 30%, комплекс ЧАС - алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 0,01% и алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,01%, а так же N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 0,03%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 0,03%, вспомогательные компоненты и воду.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке производителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания не разбавленного препарата в поверхностные, грунтовые и сточные воды.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство «Дезактив Спрей» предназначено для дезинфекции:
- небольших по площади поверхностей в помещениях, в том числе оборудования, предметов обстановки (стульев, кроватей, матрасов и т.п.), приборов (поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезии, датчики УЗИ, стоматологические наконечники, зеркала, термометры и т.д.), а также труднодоступных для обработки и требующих быстрого обеззараживания и высыхания поверхностей, в том числе загрязненных кровью (кроме покрытых лаком, акрилового стекла и других материалов, подверженных действию спиртов)
- оборудования и поверхностей санитарного транспорта после транспортировки инфекционного больного, загрязненного белья, предметов медицинского назначения и т.д.;
- резиновых и пластиковых ковриков, обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии);

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ № 10/18 по применению дезинфицирующего средства «Дезактив Спрей»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

3 года в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л, флакон с распылителем 0,5 и 0,75 л.

ДЕЗАКТИВ СПРЕЙ

ОПИСАНИЕ:

Средство «Дезактив Спрей» представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость со слабым характерным запахом спирта и применяемой отдушки.

СОСТАВ:

В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт 30%, комплекс ЧАС - алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 0,01% и алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,01%, а так же N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0,03%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 0,03%, вспомогательные компоненты и воду.

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л, флакон с распылителем 0,5 и 0,75 л.

ДЕЗАКТИВ С

САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

ОПИСАНИЕ:

Салфетки «Дезактив С» представляют собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала «СПАНБОНД» или нетканого материала «МЕЛЬТБЛАУН» (не оставляет ворсинок на обрабатываемых поверхностях), белого цвета со слабым специфическим запахом спирта или применяемой отдушки. Каждая салфетка пропитана дезинфицирующим средством «Дезактив Спрей» в количестве 3 мл.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Салфетки «Дезактив С» предназначены для применения в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в том числе стоматологических кабинетах, кабинетах диагностики, эндоскопических и колоноскопических отделениях, офтальмологических, приемных, операционных отделениях, отделениях реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, детских стационарах, акушерских клиниках (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в зонах чрезвычайных ситуаций, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в учреждениях образования, отдыха, спорта, культуры, на предприятиях социального обеспечения, в пенитенциарных учреждениях, на предприятиях общественного питания, и населением в быту

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Салфетки «Дезактив С» обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в т.ч. микобактерии туберкулеза (штамм M. Terrae), эффективно при инфекциях, вызванных особо устойчивыми возбудителями внутрибольничных инфекций, вирулицидной активностью в отношении всех известных вирусов-патогенов человека (энтеральных и парентеральных гепатитов: гепатита А, В, С, Е, D), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека (H5N2, H7N3, H9N2»), вирусы Коксаки, ЕСНО, герпеса, цитомегалии и др.); фунгицидной активностью, в том числе в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов рода Аспергиллюс. Салфетки «Дезактив С» активно разрушают на поверхностях биологические пленки.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке производителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Утилизировать как бытовой мусор

НАЗНАЧЕНИЕ:

Салфетки «Дезактив С» предназначены для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей и различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью (за исключением изготовленных из материалов, подверженных воздействию спиртов):
- небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и т.д.
- поверхности жесткой мебели.
- поверхности медицинских приборов и оборудования (в том числе поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии);
- стоматологические наконечники, зеркала, и другие мелкие инструменты простой конфигурации, предметные стекла;
- датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.);
- наконечники для клизм, термометров, фонендоскопов;
- предметы ухода за больными, игрушки из непористых, гладких материалов.
- столы (в т.ч. операционные, манипуляционные, пеленальные, родильные)
- поверхности кувезов и кроваток детских;
- телефонные аппараты, мониторы, компьютерная клавиатура и другая офисная техника;
- оборудование и поверхности машин санитарного транспорта и служб ГО и ЧС;
- резиновых, пластиковых, полипропиленовых ковриков;
- внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;
- гигиенической обработки рук, ступней ног для профилактики грибковых заболеваний.

Способ применения:
Подробно способы применения, меры безопасности, меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ № 10/19 по применению дезинфицирующего средства «Дезактив С»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Банки 60/80/100/120 салфеток, саше - индивидуальная упаковка

ДЕЗАКТИВ С

ОПИСАНИЕ:

Представляют собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала белого цвета со слабым специфическим запахом спирта или применяемой отдушки.
Обладают антимикробной активностью в т.ч. микобактерии туберкулеза (штамм M. Terrae), вирулицидной активностью в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, фунгицидной активностью, активно разрушают на поверхностях биологические пленки.

ФАСОВКА:

Банки 60/80/100/120 салфеток,
саше - индивидуальная упаковка

СОСТАВ:

На основе препарата «Дезактив Спрей»

ДЕЗАКТИВ СТИРКА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ:

Универсальное средство дезинфицирующее «Дезактив Стирка», представляет собой гранулированный порошок белого цвета с цветными гранулами. Возможно применение отдушки. Средство «Дезактив Стирка» содержит в качестве действующего вещества - перкарбонат натрия 44,0%, вспомогательные добавки, неионогенные ПАВ, и другие компоненты.
Область применения:
Средство «Дезактив Стирка» используется для применения в ЛПО и ЛПУ различного профиля, включая службы родовспоможения, в т.ч. неонатологические центры. Средство также может использоваться в учреждениях социального обеспечения, детских, включая детские сады и лагеря, образовательных, пенитенциарных, административных, курортологических учреждений, торговых предприятий и предприятий общественного питания, спортивных сооружений, гостиниц, общежитий, бань, саун, бассейнов, прачечных, парикмахерских, салонов красоты и других коммунально-бытовых объектов, объектов водоканала, энергосети, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, объектов инфраструктуры МО, МЧС и других ведомств, а также населением в быту в соответствии с потребительской этикеткой.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство «Дезактив Стирка» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в т.ч. микобактерии туберкулеза (штамм M.Terrae), эффективно при инфекциях, вызванных особо устойчивыми возбудителями внутрибольничных инфекций, вирулицидной активностью в отношении всех известных вирусов-патогенов человека (энтеральных и парентеральных гепатитов: гепатита A, B, C, E, D), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека (H5N2, H7N3, H9N2»), вирусы Коксаки, ECHO, герпеса, цитомегалии и др.); фунгицидной активностью, в том числе в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов рода Аспергиллюс. Средство «Дезактив Стирка» эффективно в отношении возбудителей паразитарных болезней (цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки гельминтов, в т. ч. в отношении возбудителей кишечных гельминтозов, остриций)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке производителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания средства в поверхностные, подземные и сточные воды.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- для одновременной стирки и дезинфекции текстильных изделий: постельного белья, одеял (байковых), полотенец, подкладных пелёнок родильного дома, пеленок новорождённых, столового, кухонного белья, текстильных расходных материалов для уборки - МОПов, моющих насадок, протирочных салфеток и пр., рабочей одежды и белья (в том числе загрязненного кровью, другими биологическими выделениями и субстратами, пищей) и других изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий из натурального шелка и шерсти) с одновременным отбеливанием ручным и механизированным способами в стиральных машинах любого типа по режиму выбранной программы.
- для дезинфекции и уборки поверхностей (пол, стены, жесткая мебель), приборов, аппаратов в помещениях ЛПО\ЛПУ, включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, станции переливания крови , детские школьные и дошкольные учреждения, а также дезинфекции и уборки санитарного транспорта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

В соответствии с Инструкцией № 10/20 по применению Средства дезинфицирующего «Дезактив Стирка»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

В невскрытой упаковке производителя – 3 года.

ФАСОВКА:

Пластиковые ведра 3 и 5 кг.

ДЕЗАКТИВ СТИРКА

ОПИСАНИЕ:

Универсальное средство дезинфицирующее «Дезактив Стирка», представляет собой гранулированный порошок белого цвета с цветными гранулами.
Эффективно в отношении всех микроорганизмов, в т.ч. микобактерии туберкулеза (штамм M.Terrae), вирулицидной активностью, фунгицидной активностью.

СОСТАВ:

Средство «Дезактив Стирка» содержит в качестве действующего вещества - перкарбонат натрия 44,0%, вспомогательные добавки, неионогенные ПАВ, и другие компоненты.

ФАСОВКА:

Пластиковые ведра 3 и 5 кг.

МИКСАМИН СЕПТИК

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО (КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК)

ОПИСАНИЕ:

Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «МИКСАМИН СЕПТИК» представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную или светло желтую жидкость с характерным запахом спирта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

* в учреждениях здравоохранения всех видов и направлений, включая родильные стационары, отделения новорожденных, неонатальные, детские, стоматологические, эндоскопические и колоноскопические отделения, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые центры, центры по трансплантации органов, станции переливания и забора крови, противотуберкулезные (или фтизиатрические) учреждения, кожно-венерологические диспансеры, микологические и др.
* на санитарном транспорте всех видов, в т.ч. в условиях транспортировки в машинах скорой помощи;
в учреждениях дезинфекционного профиля, включая санпропускники;
* в лабораториях (в т.ч. бактериологических, вирусологических, микологических, иммунологических, клинических, диагностических и др.);
* в зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и инфекционных очагах;
* в учреждениях и ведомствах: МЧС, МВД, ВС РФ и формирований ГО;
* объектах водоканала и энергосети, на предприятиях парфюмерно-¬косметической, химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности, на ветеринарных объектах, птицеводческих, животноводческих, звероводческих хозяйствах; на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, торговли;
* в детских дошкольных и школьных учреждениях, административных объектах, учреждениях соцобеспечения, коммунально-бытового обслуживания, сферы услуг, в торгово-¬развлекательных центрах, на объектах служб ритуальных услуг, моргов и т.д.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулёза – тестировано на Mycobacterium terrae, всех известных вирусов – патогенов человека (в том числе, аденовирусов, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, включая гепатиты A, B, C, D; полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ВИЧ, вирусов гриппа, в т.ч. «свиного» H1N1 и «птичьего» H5N1, парагриппа, возбудителя «атипичной пневмонии» (SARS, MERS), герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, цитомегаловирусной инфекции и т.д., фунгицидная активность в отношении грибов рода Кандида и дерматофитий.

СОСТАВ:

В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт – 60%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид- 0,02%, полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид – 0,25%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, подготовленную воду.
Транспортировка:
Все виды транспорта в оригинальной упаковке производителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания не разбавленного препарата в поверхностные, грунтовые и сточные воды.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство «МИКСАМИН СЕПТИК» предназначено для:
- гигиенической обработки рук медицинского персонала;
- обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств, в медицинских организациях (в том числе стоматологических организациях, а также при приеме родов в родильных домах и др.);
- обработки кожи инъекционного поля пациентов, в т.ч. при проведении прививок;
- обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях переливания и забора крови и др.;
- обработки кожи операционного поля, в т.ч. при катеризации и пункции суставов и органов, проведением проколов, рассечений, биопсии в ЛПУ.
- частичной санитарной обработки кожных покровов, включая лежачих больных;
- обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
- обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и других материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала, в т.ч. в случае попадания на перчатки инфекционного материала;
- с целью экспресс-дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях (пол, стены и др.);
- предметов обстановки, поверхностей приборов и аппаратов
- поверхностных (накожных) датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п) и других аналогичных медицинских изделий, допускающих обеззараживание способом протирания:
- кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электродов для грудных отведений);
- изделий медицинского назначения (кроме хирургических ИМН, а так же ИМН, имеющих полости и каналы) из различных материалов (металла, стекла, пластмассы, резины), включая медицинские тонометры, рентген-кассеты, манжеты тонометров, стетоскопы, фонендоскопы и светофонендоскопы, стоматологические инструменты (кроме вращающихся), стоматологические наконечники;
- гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических, фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятий, коммунально-бытовых служб, служб ритуальных услуг, моргов, общественного транспорта, общественного питания, молочной кухни, рынков, пищевой и перерабатывающей промышленности, птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и звероводческих хозяйств, предприятий торговли (в т.ч. кассиров и других лиц, работающих с денежными купюрами);
- внутренней поверхности обуви (из резины и пластика) с целью профилактики грибковых заболеваний и удаления неприятных запахов;
- счетчиков банкнот и монет, детекторов валют и акцизных марок, уничтожителей документов, архивных шкафов и стеллажей;
- систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры, воздуховоды, вентиляционные фильтры и др.);
- окрашенное в цвет красителя, средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» предназначено для визуализации обработанной поверхности кожи пациента:
- для обработки кожи и обозначения границ операционного и инъекционного полей пациентов в медицинских учреждениях, в машинах скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ № 020/17 по применению дезинфицирующего средства «Миксамин Септик»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л.

МИКСАМИН СЕПТИК

ОПИСАНИЕ:

Представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную или светло желтую жидкость с характерным запахом спирта.
Эффективно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулёза – тестировано на Mycobacterium terrae, всех известных вирусов – патогенов человека, фунгицидная активность в отношении грибов рода Кандида и дерматофитий.

СОСТАВ:

В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт – 60%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,02%, полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид – 0,25%, а также функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, подготовленную воду.

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л

МИКСАМИН АКВА

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

ОПИСАНИЕ:

Средство дезинфицирующее «Миксамин – аква» (далее - средство) представляет собой готовую к применению бесцветную или светло-голубую жидкость с запахом отдушки. В качестве действующих веществ средство содержит полигексаметилен бигуанид гидрохлорид - 0,9%, клатраты дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорида с мочевиной - 1,6%, а также функциональные добавки и ухаживающие за кожей компоненты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

В организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (в том числе стоматологических клиниках), а также при приеме родов в родильных домах и др. (за исключением объектов потенциально контаминированных микобактериями туберкулеза и очагов туберкулезной инфекции);
Для работников парфюмерно-косметических предприятий и фармацевтических предприятий; служащих объектов коммунальных служб и учреждений работников предприятий общественного питания, пищевой промышленности, продовольственной торговли, птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и звероводческих хозяйств; учреждений образования, культуры, отдыха и спорта, детских дошкольных и школьных учреждений; учреждений социальной защиты, пенитенциарных учреждений, сотрудников силовых ведомств, включая спасателей МЧС, личного состава вооруженных сил Министерства обороны, войск МВД и др.;

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство «Миксамин – аква» обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (исключая микобактерии туберкулеза - тестировано на M.terrae) и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью (включая вирус гепатита С, ВИЧ, вирус гриппа, в том числе грипп H1N1, H5N1, ОРВИ, герпетическую, аденовирусную инфекции), фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке производителя.

НАЗНАЧЕНИЕ:

-для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и других лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств
-для гигиенической обработки рук работников не медицинских организаций
-для гигиенической обработки рук медицинского персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, станций скорой медицинской помощи, работников лабораторий (том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических и прочих);
-для обработки кожи операционного поля пациентов в ЛПУ, медицинских кабинетах различных учреждений, а также в условиях транспортировки в машинах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях (за исключением объектов, потенциально контаминированных микобактериями туберкулеза и очагов туберкулезной инфекции);
- для частичной обработки кожных покровов (в т.ч. тело, ноги, стопы ног);
-для дезинфекции небольших по площади поверхностей, в т.ч. труднодоступных. торговли и др.;
- для применения населением в быту в соответствии с этикеткой для быта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИИ № 27 по применению дезинфицирующего средства «Миксамин – Аква»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

3 года в не вскрытой упаковке производителя

ФАСОВКА:

Флакон 1 л.

МИКСАМИН АКВА

ОПИСАНИЕ:

Представляет собой готовую к применению бесцветную или светло-голубую жидкость с запахом отдушки. Обладает антибактериальной, вирулицидной, фунгицидной активностью.

СОСТАВ:

Содержит полигексаметилен бигуанид гидрохлорид - 0,9%, клатраты дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорида с мочевиной - 1,6%, а также функциональные добавки и ухаживающие за кожей компоненты.

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л

МИКСАМИН ХЛОР

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

ОПИСАНИЕ:

Средство дезинфицирующее «Миксамин-хлор» (далее по тексту - «средство») представляет собой таблетки белого цвета со слабым запахом хлора. В качестве действующего вещества средство содержит 84% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, а также вспомогательные компоненты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство дезинфицирующее «Миксамин-хлор» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) различного профиля, включая службы переливания крови, клинико-диагностические, микробиологические, ПЦР лаборатории и пр., туберкулезно-венерологические и инфекционные больницы, паталогоанатомические отделения, отделения судмедэкспертизы, морги, аптеки и аптечные пункты, ФАПыи инфекционных очагах, в детских (дошкольных и школьных) учреждениях, фармацевтической и биотехнологической промышленности, и инфекционных очагах;
На коммунальных объектах, в учреждениях культуры, отдыха, спорта, на предприятиях общественного питания и торговли, продовольственных и промышленных рынках, в пенитенциарных учреждениях, силовых ведомств, включая МЧС,в вооруженных силах Министерства обороны, войсках МВД и формирований ГО,органов ФСБ, военных учреждениях, казармах, ветеринарных служб, учреждениях социального обеспечения;

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на M.terrae, внутрибольничных инфекций (ВБИ), особо опасных инфекций - чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, возбудителей легионеллеза), вирусов (аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных) заболеваний, гепатиты A, B, C, D; герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ, полиомиелит, энтеровирусы, ротавирусы, риновирусы, полиовирусы и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов Аспергиллус.
Транспортировка:
Все виды транспорта в оригинальной упаковке производителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания средства в поверхностные, подземные и сточные воды.
Рабочие растворы средства сливать в канализацию в разбавленном виде.

НАЗНАЧЕНИЕ:

для обеззараживания:
- поверхностей в помещениях
- предметов для мытья посуды, игрушек, предметов ухода за больными, обуви из полимерных материалов, уборочного инвентаря, выделений (кровь, моча, мокроты, рвотные массы, фекалии и др.)
- остатков пищи, посуды из-под выделений, медицинских отходов классов Б и В
- изделий медицинского назначения при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, кандидозах, дерматофитиях, при особо опасных инфекциях – чуме, холере, туляремии, сибирской язве, легионеллезе
- дезинфекции автомобильного транспорта
- при проведении заключительной, текущей и профилактической дезинфекции, для
- для генеральных уборок
- для дезинфекции мусоросборников, мусорокамер, мусоровозов и мусороуборочного оборудования, мусоростволов;
- для дезинфекции общественного транспорта;
- для использования в дезинфицирующих ковриках;
- для дезинфекции воздушных фильтров, радиаторных решеток, насадок, накопителей конденсата систем вентиляции и кондиционирования;
- для дезинфекции внешних и внутренних поверхностей систем водоснабжения, промышленных, бытовых водных резервуаров, искусственных водных резервуаров на различных объектах;
- для обеззараживания поверхностей, пораженных плесневыми грибами;
- для дезинфекции в быту в строгом соответствии с этикеткой для быта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИИ № 33 по применению дезинфицирующего средства «Миксамин – Хлор»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5.5 лет в не вскрытой упаковке производителя

ФАСОВКА:

банка 1 кг. 300 таблеток.

МИКСАМИН ХЛОР

ОПИСАНИЕ:

Представляет собой таблетки белого цвета со слабым запахом хлора.

ФАСОВКА:

Банка 1 кг. 300 таблеток.

СОСТАВ:

Содержит 84% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, а также вспомогательные компоненты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Обладает антимикробной активностью (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на M.terrae), особо опасных инфекций - чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, возбудителей легионеллеза), всех известных вирусов – патогенов, грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов Аспергиллус.

АВИЦИН

ИНСЕКТИЦИДНОЕ СРЕДСТВО (ПЕДИКУЛИЦИД)

НАЗНАЧЕНИЕ

Для уничтожения платяных, головных и лобковых вшей у взрослого населения и детей старше 5 лет, синантропных насекомых – тараканов, мух, блох, постельных клопов, рыжих домовых муравьев и комаров на объектах различных категорий, а также для уничтожения личинок мух, личинок комаров природных водоемов нерыбохозяйственного значения, городских водоемов (подвалов жилых домов, пожарных емкостей); уничтожения имаго комаров – в хорошо вентилируемых помещениях, а также для обработки наружных стен строений.

МИКРОБИОЛОГИЯ

Обладает широким спектром инсектицидного действия, предназначено для борьбы с головным, платяным и лобковым педикулезом, а также для уничтожения синантропных тараканов, мух, блох, постельных клопов, муравьев и комаров. Длительность остаточного действия более 1 месяца.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для уничтожения головных и лобковых вшей (взрослое население и дети старше 5 лет) готовят 0,15% водную эмульсию путем добавления 1 мл концентрата средства «Авицин» к 99 мл воды;
- Уничтожение платяных вшей в той же концентрации проводят замачиванием и орошением. Дезинсекцию помещений против вшей проводят орошением 0,15% водной эмульсией. Норма расхода составляет 30–50 мл/м^2. Обработку проводят ежедневно по окончании приема посетителей, в отсутствие людей;
- Для уничтожения тараканов используют 1,0% водную эмульсию. Норма расхода составляет 50 мл/м^2 обрабатываемой поверхности. Обработку проводят одновременно во всех помещениях, где обнаружены тараканы;
- Для уничтожения имаго мух на открытом воздухе используют 0,55% водную эмульсию средства «Авицин». Норма расхода 100 мл/м^2. Для уничтожения личинок комнатных мух в жидких отбросах рекомендуется использовать 1–2% водную эмульсию. Норма расхода 500 мл/м^2;
- Для уничтожения блох, постельных клопов, рабочих особей рыжих домовых и других видов муравьев используют 0,55% водную эмульсию. Норма расхода 50 мл/м^2. Способы обработки согласно инструкции по применению;
- Для уничтожения окрыленных комаров в помещениях используют 0,15% водную эмульсию средства. Норма расхода 50 мл/м^2 на невпитывающих жидкость поверхностях (стекло, кафель) и 100 мл/м^2 на впитывающих жидкость. Для уничтожения личинок комаров используют 0,012% водную эмульсию. Для приготовления 1 л рабочей водной эмульсии разводят 0,8 мл концентрата в 999,2 мл воды. Средство равномерно разбрызгивают по поверхности водоемов, подвалов жилых домов и т. п. при норме расхода 220 мл/м^2. Обработку повторяют по энтомологическим показателям.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности средства 2 года со дня изготовления. Хранить в закрытых сухих складских помещениях. Температурный режим транспортирования и хранения не ниже –10°С и не выше +50°С. Упаковка должна быть герметичной.

АВИЦИН

СОСТАВ

В качестве действующего вещества содержит перметрин (15%), а также ПАВ, стабилизатор

ОПИСАНИЕ

Прозрачная светло желтая или бесцветная жидкость (концентрат)

ФАСОВКА

Флакон 100 мл, 1 л, канистра 5 л

МИКСМЕТРИКС

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР

НАЗНАЧЕНИЕ

Принципиально новый вид дозатора, с помощью которого можно легко и изящно решать повседневные проблемы формирования объема, веса, концентрации или дозировки разнообразных жидких, сыпучих, гранулированных продуктов и веществ, которые раньше приходилось отмерять «на глазок».

ПРИМЕНЕНИЕ

Дозаторы **Mixmetrix** используются для разведения концентратов моющих, дезинфицирующих веществ, приготовления топливной смеси бензина и масла, разведения концентратов удобрений, изменения концентрации растворов, приготовления многокомпонентных растворов и смесей, правильной дозировки стирального порошка, формирования объемов химических добавок, красителей, ароматизаторов.

Mixmetrix прекрасно справляется с домашними работами в качестве кулинарной мерной емкости, коктейльного миксера или дозатора корма при выращивании щенков.

ПРИБОР ENSURE

ПОРТАТИВНАЯ МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ БЫСТРОЙ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Фирма «Hygiena», Англия, на основе ультрасовременных технологий и электроники создала уникальный, простой в эксплуатации, невероятно чувствительный и точный в результатах прибор EnSURE, который предназначен для определения степени загрязнения любых поверхностей помещений, технологического оборудования, ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающихся, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, а также воды, в течение 15 секунд, Прибор, также, определяет наличие санитарно-показательных микроорганизмов Escherichiacoli и/или колиформных бактерий, менее чем за 7 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Прибор EnSURE – портативная мини-лаборатория для быстрой оценки микробиологической безопасности позволяющая немедленно оценить эффективность предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации ИМН. Метод более точен, чем метод отпечатков на агар или традиционные смывы. Кроме того, данный тест является экспресс-методом, тогда как при традиционных микробиологических исследованиях требуется 1 - 2 дня для роста микроорганизмов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Тест не является микробиологическим и предназначен для определения общего загрязнения. Под загрязнением понимается клетки животного, растительного и микробиологического происхождения, то есть любая клетка, где имеется молекулы АТФ (аденозинтрифосфат). Клетки растительного и животного происхождения (органические загрязнения) – это благоприятная среда для роста и развития микроорганизмов. При делении бактериальной клетки каждые 20 минут создает большую опасность микробиологической контаминации уже через несколько часов.

Принцип действия EnSURE заключается во взаимодействии молекул АТФ (которые находятся в клетках) с ферментом люциферин-люциферазой в процессе биолюминисцентной реакции. Результатом такой реакции является испускание холодного свечения, которое не видно невооруженным глазом.

Для анализа потребуется сам прибор – EnSURE и стерильные пробирки: Ультраснап - для анализа поверхности, ИМН и Акваснап для анализа воды, в которых содержится фермент люциферин-люцифераза.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Для анализа поверхности необходимо ватным тампоном из пробирки Ультраснап провести по исследуемой поверхности. На ровной поверхности исследуйте квадрат 10*10 см, на неровной - постарайтесь захватить большую площадь и постоянно вращайте тампон по оси. При исследовании воды опустите резервуар Акваснапа в воду на 5-10 секунд. После взятия пробы в том и другом случае вставьте тампоны и пробирку и переломите запорный клапан. В этот момент происходит взаимодействие АТФ клеток с ферментом люциферин-люциферазой и образование холодного свечения. После активирования пробирки необходимо провести измерения в люминометре не раньше 10 секунд и не позднее 5 минут. Вставьте пробирку в люминометр и нажмите кнопку ОК. через 15 секунд считывания на дисплее появится цифровое значение, которое будет означать степень загрязнения. Чем больше цифра, тем сильнее загрязнена поверхность. Соотнесите полученные данные с нормативами и оцените чистоту поверхности.

Технические характеристики прибора.

Габаритные размеры (ш*в*г): 72 мм *191 мм *32 мм

Вес (с батареями): 260 гр

Температурный диапазон: от 5 до 400 С

Диапазон относительной влажности: от 20 до 95%

Диапазон измерений: от 0 до 9999 RLU (относительных световых единиц)

Скорость измерений: 15 секунд

Погрешность измерений: +/- 5% или 5 RLU

Объем памяти: до 2000 результатов измерений

Возможность работы с 50 пользователями

Включает программу компьютерного анализа данных SureTrend

Функция перестановки теста

Интерфейс: EIA-232

Батареи: AA, LR6 или E91, незаряжаемые 1,5V алкалиновые

Аккумуляторные (внешняя зарядка) 1,2V NiMH или NiCD

Состояние покоя (при 200 С): не менее 6 месяцев

Показатели чистоты (безопасности) в RLU			
Объекты исследования	**Чисто (безопасно)**	**Недостаточно чисто**	**Грязно (опасно)**
Металл	Менее 10	11-20	Более 20
Резина	Менее 20	21-40	Более 40
Стекло	Менее 10	11-20	Более 20
Вода ополаскивания	Менее 7	8-15	Более 15

КНИГИ

ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ДЕЛО

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

С. С. Ходжаев, А. В. Гаврилов, В. И. Денисенко, П. А. Юнаков. – М.: 000 «Дезснаб-Трейд», 2008. – 440 с.

ИНФЕКЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП)

(ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ И КОММЕНТАРИИ)

Под общей ред к.б.н.С.С.Ходжаева, 2014.-100с.



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

А. Т. Арутюнов, В. И. Денисенко, П. С. Турзин, С. С. Ходжаев/Под ред. Г. Г. Онищенко и В. И. Покровского. – С: «МЕДЖЕНТА», 2010. – 756 с.

DEZSNAB®
ДЕЗСНАБ
TRADE